

Information für Patienten

Lesen Sie dieses gesamte Schreiben sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn es enthält wichtige Informationen.

- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Worum handelt es sich bei diesem Arzneimittel und wofür wird es angewendet?

Dies ist eine homöopathische Arzneispezialität ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Was müssen Sie vor der Einnahme von diesem Arzneimittel beachten?

Dieses Arzneimittel darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegenüber dem Wirkstoff oder den genannten sonstigen Bestandteilen dieses Arzneimittels sind.

Dieses Arzneimittel enthält Alkohol (Dilution) bzw. Saccharose (Globuli)

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit des Arzneiträgers leiden.

Einnahme von diesem Arzneimittel mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen bzw. angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen bzw. anzuwenden. Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Einnahme von diesem Arzneimittel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Unmittelbar vor und nach der Einnahme von diesem Arzneimittel sollten Sie nichts essen oder trinken.

Schwangerschaft und Stillzeit, Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Die Behandlung von Kindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr darf in jedem Fall erst nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge des Arzneimittels eingenommen haben, als Sie sollten bzw. die Einnahme des Arzneimittels vergessen haben

Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie ist das Arzneimittel einzunehmen?

Menge, Häufigkeit und Länge der Einnahme sind von Ihren individuellen Beschwerden abhängig. Befragen Sie dazu Ihren Arzt oder Apotheker und bitten Sie diese um Ihre spezifischen Dosierungsangaben.

Die folgenden Angaben sind allgemeine Therapie-Empfehlungen, soweit von einem Arzt oder Apotheker nicht anders verordnet wurde.

Eine Einzeldosis besteht zumeist aus 5 Globuli bzw. 5 Tropfen Dilution – unter der Zunge zergehen lassen bzw. unter die Zunge tropfen.

bis C6/D6: bis zu 3 oder 4x täglich 5 Globuli / 5 Tropfen

C12/D12: 1 bis 2x täglich 5 Globuli / 5 Tropfen

C30/D30: 2 bis 3x wöchentlich 5 Globuli / 5 Tropfen

Hochpotenzen (LM Potenzen und C-Potenzen ab der Potenz C200) sollten, bis auf bewährte Fälle, nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker eingenommen werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab. Im Falle einer Reaktion unterbrechen Sie die Einnahme und setzen Sie diese erst nach dem Abklingen der Reaktion fort.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?

Nicht über 25° C lagern. Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (z.B.: Handy, Fernseher, Computer, Mikrowellenherde).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Weitere Informationen:

Darreichungsform, Packungsgröße, Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Bitte entnehmen Sie diese Information dem Etikett.

Dieses Arzneimittel ist apothekenpflichtig.